



ДЕЖУРНАЯ АПТЕЧКА ПРИ ОТРАВЛЕНИИ СОБАКИ: КАКИЕ ПРЕПАРАТЫ ИМЕТЬ В ТРЕВОЖНОМ ЧЕМОДАНЧИКЕ

- **Витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид) в ампулах 5% раствор для инъекций (50 мг/мл) – 2 упаковки по 10 шт.**

Дозировка: для крупной собаки (40–60 кг) при подозрении на отравление изониазидом стандартная доза пиридоксина (витамина В6, 5% раствор = 50 мг/мл) составляет 1 мл на 5 кг веса внутримышечно (в бедро), то есть 6–12 мл общей дозы, это соответствует 10–20 мг/кг (600–1200 мг). Если вы не знаете точный вес собаки, рассчитайте примерно, В6 безопасно колоть даже в избытке, т.к. витамин водорастворим. Разделите на 2–4 укола в разные места (холка, бедра) и срочно доставьте собаку в клинику для внутривенной инфузии и профессиональной помощи.

без срочного введения антидота прогноз крайне неблагоприятный, полноценных альтернатив нет (!)

Витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид) в ампулах — это 5% раствор для инъекций (50 мг/мл), используемый при дефиците витамина, заболеваниях нервной системы, анемиях и токсикозе. Препарат вводится внутримышечно, подкожно или внутривенно, обычно по 1–2 мл (50–100 мг) в сутки для взрослых.

В России препарат в ампулах широко доступен в человеческих и ветеринарных аптеках без рецепта и стоит недорого.


(если нет пиридоксина, некоторые врачи предлагают использовать пирацетам, но он не может заменить В6 – собаку нужно доставить в клинику как можно быстрее)

- **Пирацетам 20% 5 мл 10 шт**

Дозировка: для крупной собаки (40–60 кг) доза 0,5–1 мл/кг внутримышечно или внутривенно (только по согласованию с врачом!!!), вводить медленно в капельнице или шприцем в разные места (в бедро). Повторите через 4–6 ч при необходимости, сочетая с АТФ и глюкозой.

- **Витамин К1 (фитоменадион, конакион, викасол) – при отравлении крысиным ядом лечение длительное, только под контролем врача!**

- АТФ (натрия аденозинтрифосфат) 10мг/мл раствор для в/в введения
- активированный уголь (6-10 таблеток), «Энтеросгель» (1 ст. ложка), «Полисорб» (1 ст. ложка)
- противосудорожные препараты (валиум, диазепам)
- преднизолон или дексаметазон
- шприцы одноразовые 5 мл
- перекись водорода 3% 100 мл 1 шт
- адрес и телефон ближайшей ветеринарной службы



ЭКСТРЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ОТРАВЛЕНИЕ И ВИДИМЫХ СИМПТОМАХ ОТРАВЛЕНИЯ СОБАКИ

С самого начала - звонить в ближайшую ветеринарную клинику и спросить, могут ли они срочно принять отравленную собаку, описать по телефону симптомы, немедленно собираться и ехать с собакой к ветеринару!

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫЖИВАНИЮ. Убедитесь, что в клинике, куда едете, есть антидот. Если нет – срочно ищите другую клинику. Некоторые отравляющие вещества, бытовая химия и яды (соль, антифриз) не имеют специфических антидотов в домашних условиях, единственный шанс – срочно ехать в ветеринарную клинику, делать капельницы и переливание крови.

Первую помощь лучше всего оказывать по дороге в клинику и по рекомендации ветеринара, если их нет, вот краткая инструкция:



1) Если собака схватила отраву у вас на глазах, имеет смысл постараться вызвать рвоту, влив в глотку большое количество воды (**внимание – щенкам и собакам с короткой мордой вливать воду и вызывать рвоту нельзя – может захлебнуться!**) или перекись водорода 3% (1 ложка на корень языка). Это имеет делать для того, чтобы снизить количество впитавшегося яда.


2) Уколоть **витамин В6 (пиридоксин)** внутримышечно в дозировке 1 мл на 5 кг веса (**на крупную собаку весом в 60-80 кг доза составит 10-12 мл**), лучше разделить дозу на 3-4 укола в **разные участки мышцы бедра**.



3) Дать **сорбенты** (активированный уголь, энтеросгель, полисорб)

4) При судорогах ввести диазепам (валиум) в количестве 0,5 мг/кг внутримышечно по согласованию по телефону с ветеринаром

5) Как можно быстрее доставить собаку к ветеринару.



ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ и СИМПТОМЫ ОТРАВЛЕНИЯ У СОБАК

Симптомы отравления проявляются **от нескольких минут** до нескольких дней в зависимости от отравы / действующего вещества.

Изониазид действует быстро – противоядие (витамин В6) нужно ввести срочно! Собаку можно потерять за несколько минут. Симптомы проявляются во время прогулки или сразу после – собаке резко становится плохо.

Обычно именно на прогулке собака подбирает то, что подкидывают догхантеры, после этого ситуация развивается стремительно. **КАЖДАЯ МИНУТА дорога, чтобы помочь собаке у вас есть не более 30 минут!** Главный маячок – только что всё было нормально, а тут **РЕЗКОЕ** изменение поведения и настроения.

Симптомы отравления: вялость, неуверенные движения, шаткая походка, нарушения координации, заторможенность, стремление лечь, уйти, спрятаться, слабость, пена изо рта, дрожь, рвота, судороги, диарея, побледнение десен, хрипы, отдышка, трудности с дыханием, собака без сознания.

КАК ЗАЩИТИТЬ СВОЮ СОБАКУ ОТ ОТРАВЛЕНИЯ?

Самое идеальное - попытаться воспитать вашу собаку так, чтобы она **ничего не подбирала на улице и не брала корм из рук у чужих**.

Если вы увидели, что собака схватила на улице подозрительный кусок, постарайтесь тут же вытащить всё, что осталось. Это не обезопасит на 100%, но уменьшит количество попавшего в организм яда. Не давайте нюхать **розовый снег** – это яд.

